

## CLASSIS III.



## AMPHIBIA.

PESSIMA tetraque Animalia *Corde uniloculari uniaurito, Pulmonibus arbitrariis, Pene duplii dignoscuntur.*

AMPHIBIA pleraque horrent Corpore frigido, Colore lurido,  
Scelto cartilagineo, Cuta foeda, Facie forva, Obtutu-  
meditabundo, Odore tetro, Sono rauco, Loco iquali-  
do, Veneno horrendo; non itaque in horum numerum  
se se jactavit eorum Auctor.

POLYMORPHA in his Amphiibis natura duplicem vitam pleris-  
que concessit: Aliis *Metamorphosin* subire, aliis *Senectam*  
exuere; aliis *Ovo* nasci, aliis *nudos foetus* parere; aliis  
in *siccо humidoque* prouincue vivere, aliis dimidio anno  
*hyemare*; aliis praedam nisi astuve assequi, aliis fascino  
quasi eandem in fauces revocare.

REPTILES pedati, auribus plano-denudatis absque auriculis, va-  
riam vitam ex structura agunt: *Testudines* maniuntur  
Testa; *Dracones* evolant Alis; *Lacertae* fugiunt Pedibus;  
*Ranæ* absconduntur Loco; nec omnes Veneno prouersus  
carent, ut *Bufo*, *Salamandra*, *Gecko*.

SERPENTES apodes, absque *Auribus* surdos, a Piscibus fe-  
parant Pulmones, Ovorum catena, Penisque duplex  
muricatus, affinitas denique cum *Lacertis* tanta, ac *La-*  
*certarum* cum *Ranis*, vixque limites admittens. Hos nuda  
in terra reiectos, artuum ministerio expertes, omnium in-  
juriaz expositos, armavit Natura conservatrix suis *armis*  
horremibus exsecrabilis *Veneno*, in diversis diverso. Sunt  
autem

autem hæc *Tela* dentibus simillima, sed extra maxillam superiorem collocata, proque lubitu exferenda & retrahenda, sacculo sanie affixa, quam vulnere infiant in sanguinem, tum diri effectus caussam, cæterum inertem; sive que Catonia hæc mortu virus habent & fatum dente minantur, pocula morte carent, prout solide *Redi*. Ne vero hi spoliati miserique armis, quæ ipsis supereffent, nimium fævirent, decimam quamque tantum speciem armavit (♂) imperans, sed versipelles eos voluit, ut dubii omnes metuerentur ab omnibus; at *Beneficus Homini* dedit INDIIS *Ichneumonem* cum *Ophiorbiza*, AMERICANIS *Suem* cum *Senega*, EUROPAEIS *Ciconium*. cum *Olea*.

**DIAGNOSIN**, qui velit horum, eandem desumat a Pedum succedaneis *Scutis abdominalibus caudalibusque*; ne vero numerus alteri demius alterique additus seduoat, juvat etiam uterque connumeratus (*Aet. Stockh. 1752. p. 206.*); ab ano utrinque Longitudo illustrat, & Color in nonnullis; cave vero ne renata sit mutilata cauda.

NANTES pinnatos aquaticos (*Chondropterygios* cartilagineosve dictos Pisces) Amphibiorum classem nunc subire jubent Pulmones (\*) arbitrarii, Latere licet, non vero branchiis liberis, sed adhatis, respirantes; Maresque Pene dupli ci incidentes Feminis! ovis concatenatis foetis, foedaque Cutis, Ossaque cartilaginea, cætera. Neque hi omnes Toxico expertes, teste Pastinaca, Torpedine.

**AMPHIBIOLOGI** omnium paucissimi sunt, nullique veri.

*Seba* numero stupendo tibi ignota pulchre collegit & delineavit, sed multiplicavit, minimeque descripsit. *Catesbeaus* nec paucos Serpentes pulchrius delineavit, quam notavit.

(\*) Pulmores horum pectinati ut Piscium, sed adnatæ vasi arcato cylindrico tubuloso, absque radio osse, nec piscium simili, nisi externa figura.

## GENERUM Characteres.

## I. REPTILES pedati, spirantes ore:

103. TESTUDO *Corpus Testa munitum.*  
 104. DRACO *Corpus Alis volatile.*  
 105. LACERTA *Corpus (Testa Alisve) nudum, caudatum.*  
 106. RANA *Corpus similiter nudum, e caudatum.*

## II. SERPENTES apodes, spirantes ore:

107. CROTALUS *Scuta Abdominalia Caudaliaque cum Crepitaculo.*  
 108. BOA *Scuta Abdominalia Caudaliaque absque Crepitaculo.*  
 109. COLUBER *Scuta Abdominalia; Squamae Caudales.*  
 110. ANGUIS *Squamae Abdominales Caudalesque.*  
 111. AMPHISBÆNA *Annuli Abdominales Caudalesque.*  
 112. COECILIA *Rugæ nude laterales.*

## III. NANTES pinnati, spirantes lateribus:

113. PETROMYZON *Spiracula 7.*  
 114. RAJA *Spiracula 5 subtus. Corpus depresso.*  
 115. SQUALUS *Spiracula 5 lateralia. Corpus teres.*  
 116. CHIMÆRA *Spiracula 1. Dentes primores incisores 2.*  
 117. LOPHIUS *Spiracula 1. Pinnæ pectorales brachio inseratae.*  
 118. ACIPENSER *Spiracula 1. Os retractile.*

## I. REPTILES.

*Os respirans.**Pedes quatuor.*

**103. TESTUDO.** *Corpus tetrapodium, caudatum, testa obtectum.*

**Mydas.** 1. T. pedibus pinniformibus, unguibus palmarum binis, plantarum solitariis, testa ovata.

*Amœn. acad.* 1. p. 138. *Testudo unguibus acuminatis: palmarum duobus, plantarum uno.*

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 50. *Testudo atra.*

*Osb. iter.* 293.

*Gesn. quadr.* 78. *Testudo marina.*

*Aldr. quadr.* 712. t. 714.

*Grew mus.* 38. t. 3. f. 4.

*Olear. mus.* 27. t. 17. f. 1.

*Bradt. natur.* t. 4. f. 4.

β. *Seb. mus.* 1. t. 80. f. 9. *Testudo marina americana*  
*Mydas dicta.*

*Amœn. acad.* 1. p. 137. *Testudo eadem.*

*Marcgr. bras.* 241. *Jurucuja brasiliensibus.*

*Raj. quadr.* 256.

γ. *Amœn. acad.* 1. p. 287. n. 7. *Testudo unguibus acuminatis, palmarum plantarumque solitariis.*

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 50. *Testudo eadem.*

*Seb. mus.* 1. t. 79. f. 4. 5. 6.

*Habitat ad insulas Pelagi: insulam Adscensionis &c.  
ova membranacea noctu in Arena calcarea rotunda  
defodit.*

*Caro viridescens, esculenta; resupinata in mare dormiens natat; incedit tot hominibus, quot ei infstant; in terra resupinata non erigitur. Testa olim pro scutis, fornicibus.*

**Caretta.** 2. T. pedibus pinniformibus. unguibus palmarum plantarumque binis, testa ovata acute ferrata.

*Gron. mus.* 2. p. 85. n. 69. *Testudo pedibus natatoriis, unguibus acuminatis binis.*

*Brown. jam.* 465. *Testudo unguibus utrinque binis acutis, squamis dorfi quinque gibbis.*

*Catesb. car. 2. p. 39. t. 39. Testudo Caretta Rochef.  
Raj. quadr. 258. Testudo Caretta.  
Habitat ad insulas Americanas.*

- orbicula- 3. T. pedibus palmatis, testa orbiculata planiuscula.  
*Raj. quadr. 254. Testudo aquarum dulcium?  
Habitat in meridionalibus Europæ.  
Testa parva integerrima orbiculata, nec antice nec postice emarginata. Sternum postice bifidum. Pedum digitii membrana connexi in plantam orbiculatam.*
- scabra. 4. T. testa planiuscula, scutellis omnibus intermediis dorsatis.  
*Habitat in Indiis.  
Corpus ♂ testæ latera subtus albo nigroque varia: Sternum antice truncatum.*
- lutaria. 5. T. pedibus subpalmatis, cauda corpore dimidio breviore, testa subconvexa postice tribus scutellis carinata.  
*Amœn. acad. 1. p. 139. n. 23 Testudo unguibus acuminatis, palmarum plantarumque quaternis.\*  
Habitat in Italia, Oriente.  
Palmæ magis palmatae, plantæ minus. Sternum postice truncatum.*
- græca. 6. T. pedibus subdigitatis, testa gibba margine lateralí obtusissimo, scutellis planiusculis.  
*Testudo tessellata minor africana. Edw. av. 204. t. 204.  
Habitat in Africa.  
Corpus caudatum, palmis unguibus 5, plantis vero 4.*
- carolina. 7. T. pedibus digitatis, testa gibba, cauda nulla.  
*Testudo tessellata minor caroliniana. Edw. av. 205.  
t. 205.  
Habitat in Carolina.  
Palmæ pentadactylæ, Plantæ tetradactylæ.*
- carinata. 8. T. pedibus digitatis, testa gibbosa, scutellis dorsalibus quatuor a terioribus carinatis, sterno integro.  
*Habitat in Calidis regionibus.*

## 9. T.

*Testudines absciso capite saepè 14 dies vivunt; hycme in frigidioribus hybernant terrestres. Nullum animal Testudine tardius; copula coherent saepè per mensem.*

geome- 9. T. pedibus posticis palmatis, testæ scutellis elevatis  
trica. truncatis.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 50. *Testudo unguibus acuminatis:*  
*palmarum* 5, *plantarum* 4.

*Worm. mus.* 317. *Testudo pieta f. stellata.*

*Amœn. acad.* 1. p. 139 n. 24.

*Grew. mus.* 36. t. 3. f. 1, 2. *Testudo testa tessellata*  
*major.*

*Seb. mus.* 1. t. 80. f. 8. *Testudo minor amboinenensis.*

*Pis. bras.* t. 105. *Testudo nigricantibus & flavescen-*  
*tibus figuris geometricis.*

*Raj. quadr.* 259. *Testudo tessellata minor.*

*Habitat in Asia.*

*Testa nigra scutellis flavis radios flavos anastomosantes e-*  
*mittentibus.*

*pusilla.* 10. T. testa hemisphærica: scutellis convexis trapeziis  
marginè striatis disco punctatis.

*Grew. mus.* 38. t. 3. f. 3. *Testudo virginea*

*Worm. mus.* 313. *Testudo terrestris pusilla ex India o-*  
*rientali.*

*Raj. quadr.* 259. *Testudo eadem.*

*Habitat in India.*

*serpentini-* 11. T. pedibus digitatis, testa subconvexa postice obtusa  
*na.* acute quinque-dentata.

*Habitat in Calidis regionibus.*

#### 104. DRACO. *Corpus tetrapodium, caudatum, ala-* *tum.*

*volans.* 1. DRACO. *Syst. nat.* 36. *Gron. mus.* 2. p. 73. n. 46.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 40. *Draco.*

*Amœn. acad.* 1. p. 126. *Lacerta canda tereti, pedibus*  
*pentadactylis, alis femore connexis, crista guttæ triplici.*

*Bont. jav.* 57. t. 57. *Lacertus volans f. Dracunculus.*

*Seb. mus.* 2. t. 86. f. 3. *Lacerta africana volans f.*  
*Draco volans.*

*Testudinibus. Pedum digiti antici 3, postici 4, totidem inzibis, exceptis marginis*  
*pinniformibus pedibus. Scuta testæ numerop sapienti convenient, unde diagnosis*  
*Speciem difficilior.*

*Dracones omnes regni orthonorum febales sunt, ut HYDRA, *Seb. mus.* 1. t. 102.*  
*f. 1. Hamburgo a nobis visa, non natura, sed artis opus eximium.*

*Bradl. natur. t. 9. f. 5. Lacerta volans.*  
*Habitat in India, Africa.*

105. LACERTA. *Corpus tetrapodum, caudatum, nudum.*

\* *Cauda compressa.*

- Croco- 1. *L. cauda compressa, pedibus triunguiculatis, palmis  
dilus. pentadactylis, plantis tetradactylis palmatis.*  
*Amoen. acad. I. p. 121. Lacerta eadem.*  
*Mus. Ad. Fr. I. p. 40. Lacerta eadem.*  
*Gron. mus. 2. p. 74. n. 47. Crocodilus.*  
*Bellon. aquat. 41. Crocodilus.*  
*Gesn. quadr. 9. Crocodilus.*  
*Aldr. aquat. 677. Crocodilus.*  
*Foist. quadr. t. 79 f. 3. Crocodilus.*  
*Raj quadr. 261. Lacertus maximus.*  
*Bont jav. t. 55. Crocodylus Cayman.*  
*Maricgr. bras. 242. Jacare.*  
*Olear. mus. 8. t. 7 f. 3. Crocodylus.*  
*Bell. mus. 47 t. 13. Crocodilus niloticus.*  
*Sloan jam. 2. p. 332. Crocodilus.*  
*Seb. mus. I. t. 103. 104. Crocodilus.*  
*Merian. sur. 49. f. 69. Crocodil.*  
*Vallifn. nat. I. t. 43.*  
*Catesb. car. 2. t. 63. Lacertus maximus.*  
*Habitat in Africæ, Asiæ, Americæ Aquis.*  
*Anatome Crocodili. Hasselq. iter. 292.*  
*Ova centena deponit, effodiuntur ab Ichneumone, avicula; exclusos pullos Mater in tergum provocat, ad aquas. dicit, deciduos Mas Feminaque ingurgitant; sub aqua vorat; in catenam associati aquatilia exagitant. Leviathan Jobi. 40: 20; 41: 24.*  
*Fugientibus atrox; educti dorso ipsius insiliunt, regunt.*
- Caudiver- 2. *L. cauda depresso-plana pinnatifida, pedibus palmatis.*  
bera. *Fevill. peruv. 2. p. 319. t. 319.*  
*Seb. mus. 2. t. 62. f. 9.*  
*Habitat in Peru.*
- superci- 3. *L. cauda carinata, dorso superciliisque ciliatis.*  
liosa. *Mus. Ad. Fr. I. p. 40. Lacerta eadem.\**

*Seb. mus. 1. t. 109. f. 4.*

*Habitat in Indiis.*

**scutata.** 4. L. cauda subcompressa mediocri, sutura dorsali dentata, occipite bimucronato.

*Seb. mus. 1. p. 173. t. 109. f. 3.* Salamandra prodigiosa amboinenensis scutata.

*Habitat in Asia.*

**Monitor.** 5. L. cauda carinata, corpore mutico.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 41.* Lacerta cauda ancipi integra, pedibus pentadactylis, digitis omnibus unguiculatis.\*

*Seb. mus. 2. t. 86. f. 2.*

*t. 105. f. 1.*

*t. 1. t. 94. f. 1. 2.*

*Habitat in Indiis.*

Corpus maculis albis ocellatis verticillatum. Fascia abdominalis albi lineares interruptæ.

**principa-** 6. L. cauda subcarinata, crista gulæ integerrima, dorso lævi.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 43.*

*Amœn. acad. 1. p. 286. t. 14. f. 2.*

*Habitat in Indiis.*

**bicarina-** 7. L. cauda compressa supra bicarinata mediocri, dorso ta. quadrifariam carinato-striato.

*Habitat in Indiis.*

*Parva, grisea.* Dorsum striis duabus elevatis & latera dorfi singula ex squamis carinato-striata; Latera squamis convexo-tuberculatis. Abdomen 24 ordinibus transversalibus squamarum (in singulo 6.) rectum. Cauda corpore vix sesquilonior, compressa, subtus striata, lateribus lævis, supra dupli carina angulata. Crista nulla.

**palustris.** 8. L. cauda ancipi mediocri, pedibus muticis fissis; palmis tetradactylis. *Fn. svec. 256.*

*Gron. mus. 2. p. 77. n. 51.* Salamandra alepidota verrucosa.

*Raj. quadr. 273.* Salamandra aquatica.

*Seb. mus. 1. t. 89 f. 4, 5.* Lacerta americana.

*Habitat in Europæ aquis dulcibus stagnantibus.*

*An distincta species a L. agili vel larva aliis.*

\* \* *Cauda verticillata.*

**Cordylus.** 9. *L. cauda verticillata brevi: squamis denticulatis, corpore lœvigate.*

*Amœn. acad. 1. p. 132. 292.*

*Gron. mus. 2. p. 79. n. 55. Cordylus.*

*Seb. mus. 1. t. 84. f. 3. 4. & 2. t. 62. f. 5.*

*Habitat in Africa, Asia.*

*Corpus squamis truncatis verticillatum.*

**Stellio.** 10. *L. cauda verticillata mediocri: squamis denticulatis, capite corporeque muricato.*

*Hasselq. iter. 301. Lacerta Stellio.*

*Tournef. itin. 1. p. 119. t. 120. Lacerta Coflordilos dicta.*

*Seb. mus. 2. t. 8. f. 7.*

*Habitat in Oriente: Delos, Ægypto, Africa.*

**mauritania.** 11. *cauda subverticillata brevi muricata apice lœvi, corpore nica, supra muricato, pedibus subtus squamatis.*

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

*Corpus habitu & figura L. Gecko, sed Iuridum & ad latera capitis, supra collum, dorsum, femora, verrucosum mucronibus. Cauda corpore brevior, a basi ad medium spinis sexfariam muricata, inde ad apicem lœvis. Digihi pedum omnino ut in Gecko subtus lamelloso-squamati, unguibus minimis. Subtus totum corpus lœve squamis minimis.*

**azurea.** 12. *L. cauda verticillata brevi: squamis mucronatis.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 42. Lacerta eadem.*

*Seb. mus. 2. t. 62. f. 6.*

*Habitat in Africa.*

**turcica.** 13. *L. cauda subverticillata mediocri, corpore griseo subverrucoso.*

*Edw. av. 204. t. 204. Lacerta minor cinerea maculata asiatica.*

*Habitat in Oriente.*

*Cauda vix corpore longior, obsolete verticillata. Corpus parvum, griseum, punctis fuscis irroratum, inæquale & quasi verrucis obsoletis adpersum.*

**Ameiva.** 14. *L. cauda verticillata longa, scutis abdominalis triginta, collaris subtus ruga duplo.*

*Amœn. acad. 1. p. 127. 293. Lacerta cauda tereti corpore duplo longiore, pedibus pentadactylis, crista nulla, scutis abdominalibus 30.*

*Mus.*

*Mus Ad. Fr.* 1. p. 45. *Lacerta eadem.*

*Gron. mus.* 2. p. 80 t. 56. *Lacerta cauda tereti corpore triplo longiore, squamis lœvissimis, abdominalibus oblongo-quadratis.*

*Clus exot.* 115. *Lacertus indicus.*

*Edw. av.* 202. t. 202, 203. *Lacertus major viridis.*

*Worm. mus.* 313. f. 313.

*Raj. quadr.* 270. *Lacertus indicus.*

*Seb. mus.* 1. t. 85. f. 2, 3.

t. 88. f. 1, 2.

*Sloan. jam.* 2. p. 333. t. 273. f. 3. *Lacertus major cinnereus maculatus.*

*B. Amœn. acad.* 1. p. 130. *Lacerta cauda tereti corpore sesquiongiore, pedibus pentadactylis, dorso lineis longitudinalibus striato.\**

*Habitat in America.*

*agilis.* 15. *L. cauda verticillata longiuscula squamis acutis, collari subtus squamis constructo.*

*Faun. svec.* 1352. *Lacerta cauda tereti verticillata longitudine corporis, pedibus pentadactylis unguiculatis.*

*Syst. nat.* 36 n. 6. *Lacerta cauda tereti longa verticillata squamis acutis, pedibus pentadactylis unguiculatis.*

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 43. *Lacerta eadem.*

*Gron. mus.* 2. p. 80. n. 57. *Lacerta cauda corpore parum longiore, squamis lœvissimis.*

*Raj. quadr.* 264. *Lacertus vulgaris, ventre nigro maculato.*

*Seb. mus.* 2. t. 79. f. 4. *Lacerta minor maculata indigena.*

*B. Raj. quadr.* 264. *Lacertus viridis.*

*Aldr. quadr.* 634. *Lacertus viridis.*

*Seb. mus.* 2. t. 4. f. 4. 5. *Lacerta viridis.*

*Habitat in Europa, India.*

*Variat in australi Europa colore viridi; Indica pulchrius colorata. Femora postica subtus linea e punctis callosis notata, ut in L. Ameiva.*

*algira.* 16. *L. cauda verticillata longiuscula, corpore lineis utrinque duabus flavis.*

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

*Corpus vix digito longius, supra fuscum, subtus flavescens. Squamæ dorsales carinatæ, acutiores. Linea utrinque flava dorsum includit & alia utrinque abdomen distinguunt a lateribus.*

Seps. 17. L. cauda verticillata longa, futura laterali reflexa, squamis quadratis.

*Amœn. acad. I. p. 293.* Lacerta cauda verticillata, pedibus subpentadactylis, squamis quadratis.\*

*Habitat in Meridionalibus.*

*Pedes breves, remotissimi, cursorii; Abdomen planum.*

angulata. 18. L. cauda hexagona longa, squamis carinatis mucronatis.

*Habitat in America. Rolander.*

*Parva dorso fusco. Squamæ omnes, exceptis abdominalibus, mucronatae, valde carinatae. Caput nudum, rugis variis elevatis; postice, ubi squamæ colli incipiunt, quasi truncatum & annexum; sub Gula squamæ 2, magnæ, rotundatae. Cauda corpore sesquialongior, hexagona, valde angulata.*

\* \* \* *Cauda tereti imbricata, corpore longiore.*

Chamæ- 19. L. cauda tereti brevi incurva, digitis duobus tribus-leon. que coadunatis.

*Amœn. acad. I. p. 290, 501. Idem.*

*Mus. Ad. Fr. I. p. 45. Idem.*

*Gros. mus. 2. p. 76. n. 50. Chamæleon.*

*Olear. mus. 9. t. 8. f. 3. Chamæleon.*

*Bellom. itin. l. 2. c. 60. Chamæleon.*

*Best. mus. t. 12. Chamæleon.*

*Valent. mus. l. 3. c. 31. Chamæleon.*

*Kircher. mus. 275. t. 293. f. 44. Chamæleon.*

*Tonst. quadr. t. 79. Chamæleon.*

*Seb. mus. 1. t. 82. f. 3. 4. 5. & t. 83. f. 5.*

*Aldr. quadr. 670. Chamæleon.*

*Habitat in Africa, Asia.*

*Anatome Chamaleontis. Hasselq. iter. 297.*

*Variat vertice piano & carinato. Intumescit detumescitque lente corpus. Oculi tecti: pupilla nuda aurata fulgentissimi. Incessus tardus pedibus opposite anomalis caudaque scandente. Lingua lumbriciformis, longissima, muscicapa. Colores mutat in calidis; noctu vigili.*

Salaman- 20. L. cauda tereti brevi, digitis muticis, corpore porosodra.

*Amœn. acad. I. p. 131. Lacerta cauda tereti brevi, pedibus inermibus: palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 45.* Lacerta eadem.

*Matth. diosc. 274. f. 274.* Salamandra.

*Gesn. quadr. 80.* Salamandra.

*Aldr. quadr. 641.* Salamandra terrestris.

*Jonst. quadr. t. 77. f. 10.*

*Olear. mus. t. 8. f. 4.*

*Seb. mus. 2. t. 12. f. 5.*

*Raj. quadr. 173.* Salamandra terrestris.

*Habitat in Europa.*

*Corpus nudum absque squamis, poris pertusum.*

*Ferebatur antiquitus in igne vivere, sed expertus Bartholinus; oleum e poris exsudans pro pectoralio habetur.*

**Gecko.** 21. L. cauda tereti mediocri, digitis subtus imbricatis, corpore verrucoso.

*Amœn. acad. 1. p. 133. 292.* Lacerta cauda tereti mediocri, pedibus pentadactylis: digitis cristatis imbricatis, corpore verrucoso.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 46.* idem.

*Hasselqv. iter. 306.* Lacerta *Gecko* cauda tereti mediocri, pedibus cristatis subtus longitudinaliter lamellosis.

*Gron. mus. 2. p. 78. n. 53.* Salamandra.

*Seb. mus. 1. t. 168. f. 2-8.*

*Bont. jav. 57.* Salamandra indica.

*Habitat in Indiis, frequens etiam in domibus.*

*Pedibus exhalat venenum in esculentis (an urina?) Hasselqv. Mansueta; homo asylum.*

**Scincus.** 22. L. cauda tereti mediocri apice compressa, digitis mutatis marginatis.

*Gron. mus. 2. p. 76. n. 49.* Scincus.

*Seb. mus. 2. p. 112. t. 105. f. 3.*

*Bestl. mus. 1. 12. f. 1.*

*Olear. mus. 9. t. 8. f. 1.*

*Raj. quadr. 271.* Scincus.

*Amœn. acad. 1. p. 294.*

*Hasselqv. act. upf. 1750. p. 30.*

- - - itin. 309. n. 58.

*Habitat in montosis Lybiæ, Ægypti, Arabiae petreæ.*

*Corpus officinale pro aphrodisiaco.*

**hispida.** 23. L. cauda tereti mediocri, vertice trimuricato.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 44.* Lacerta eadem.

*Seb. mus. 1. t. 109. f. 6.*

*t. 83. f. 1. 2.*

*Habitat in America australi.*

*orbicula-* 24. L. cauda tereti brevi, trunco subgloboſo ſupra mu-  
ris. *ricato.*

*Seb. mus. 1. p. 134. t. 83. f. 1. 2.* *Lacertus orbicula-*  
*rnis spinofus.*

*Hernand. mex. 327, 328.* *Lacertus orbicularis.*

*Raj. quadr. 263.* *Lacertus orbicularis.*

*Habitat in Mexico.*

*vulgaris.* 25. L. cauda tereti mediocri, palmis tetradactylis, pedibus  
muticis.

*Faun. ſvec. 254.* *Lacerta pedibus inermibus, manibus*  
*tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore livido: li-*  
*nea dorsali fulva dupliſci.*

*Raj. quadr. 264.* *Lacerta vulgaris.*

*Habitat in Europa, Larva ſub aquis.*

*aquatica.* 26. L. cauda teretiuscula mediocri, pedibus muticis fiffis:  
palmis tetradactylis. *Fn. ſvec. 257.* *Syft. nat. 6. p. 36. n. 8.*

*Gron. mus. 2. p. 78. n. 52.* *Salamandra alepidota, cau-*  
*da teretiuscula.*

*Gesn. ovip. 31.* *Lacertus aquaticus.*

*Seb. mus. 2. p. 15. t. 12. f. 7.* *Salamandra ceylanica.*

*Habitat in Europæ aquis dulcibus, stagnantibus.*

*Utrum hæc diſtincta ſpecies vel larva prioris nondum*  
*rite perſpectum habeo.*

\* \* \* \* *Cauda tereti imbricata, corpore longiore.*

*Bafili-*  
*ſcus.* 27. L. cauda tereti longa, pinna dorsali radiata, occipite  
cristato.

*Seb. mus. 1. t. 100. f. 1.*

*Habitat in America australi.*

*Igvana.* 28. L. cauda tereti longa, ſutura dorsali dentata, crista  
gulæ denticulata.

*Amœn. acad. 1. p. 123. 287.* *Lacerta cauda tereti, pe-*  
*dibus pentadactylis, crista dorſi longitudinali, gulæ*  
*pendula antice dentata.*

*Muf. Ad. Fr. 1. p. 43.* *Idem.*

*Gron. mus. 2. p. 82. n. 60.* *Igvana.*

*Maregr. bras. 236. f. 236.*

- Fonst. quadr. t. 77. f. 5.*  
*Jacob. mus. t. 4.*  
*Olear. mus. t. 6. f. 1. Yvana.*  
*Bont. jav. 56. t. 56. Lacerta Leguan.*  
*Marcogr. bras. 236. Senembi s. Igvana.*  
*Nieremb. nat. 271. t. 271.*  
*Ovied. amer. l. 13. c. 3.*  
*Rhed. exper. 100. t. 101. Igvane.*  
*Worm. mus. 313.*  
*Sloan. jam. 2 p. 333.*  
*Raj. quadr. 265. Lacertus Senembi & Igvana.*  
*Seb. mus. 1. t. 95. f. 1. 2.*  
*96. f. 4.*  
*97. f. 3.*  
*98. f. 1.*  
*Clus. exot. 116. Yvana.*  
*Catesb. car. 2. p. 64. t. 64?*  
*Habitat in Indiis.*  
*Capitur linea laqueari; Caro omnium sapidissima, Siphiliticis noxia.*

**Calotes.** 29. L. cauda tereti longa, dorso antice capiteque postice dentato.

- Amoen. acad. 1. p. 289.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 44.*  
*Seb. mus. 1. t. 91. f. 3, 4.*  
*t. 93. f. 2.*  
*Habitat in Asia: Zeylona.*  
*Corpus caruleum squamis acutis, subtus striatum. Spinæ dorsi lamellatæ.*

**Agama.** 30. L. cauda tereti longa, collo supra capiteque postice aculeato.

- Amoen. acad. 1. p. 288.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 44.*  
*Seb. mus. 1. t. 107. f. 1. 2. 3.*  
*Habitat in America.*  
*Color corporis pallidus. Abdomen minime striatum.*

**Umbra.** 31. L. cauda tereti longa, nucha suberistata, occipite calloso, dorso striato.

- Habitat in Meridionalibus.*  
*Plica profunda sub gula. Color corporis nebulosus.*

- Plica. 32. L. cauda tereti longa, occipite calloso, palpebris supra excoriatis, collo lateribus verrucoso subtus plicato.  
*Habitat in Indiis.*  
*Corpus præter caudam vix digito majus, in meo specimine, tectum undique squamis conicis (velut Chagrin). Occiput callosum & Supercilia subcrenata, supra exoriata cicatrice membranacea transverse in 3 partes sulco distincta. Pone aures ad latera capitis & colli verruca 2, muricatae. Collum subtus dupli plica. Dorsi sutura majoribus squamis antice quasi crenata. Ruga elevata a collo supra brachia excurrit utrinque & in medio trunci deflectitur. Cauda teres, tecta squamis minutissimis; vix manifeste verticillata, corpore duplo longior. Digi longi, subtus squamis acutioribus scabri; unguis compressi.*
- marmo- 33. L. cauda tereti longa, gula subcristata antice dentata, rata. dorso laevi.  
*Amaen. acad. I. p. 129. 188.*  
*Mus. Ad. Fr. I. p. 43.*  
*Seb. mus. 2. t. 76. f. 4.*  
*Habitat in Hispania.*  
*Corpus compressum; Cauda striata.*
- bullaris. 34. L. cauda tereti longa, vesica gulari.  
*Catesb. car. 2. t. 66. Lacerta viridis jamaicensis.*  
*Habitat in Jamaica.*  
*Parva, corpore viridi; sub gula globus ruber vesicularis retractilis.*
- strumosa. 35. L. cauda tereti longa, pectore gibbo protenso.  
*Seb. mus. 2. t. 20. f. 4. Salamandra mexicana strumosa.*  
*Habitat in America australi.*  
*Pectus s. Sternum antice prominet in mucronem obtusum.*
- Tegui- 36. L. cauda tereti longa, sutura lateralí plicata.  
 xin. *Amaen. acad. I. p. 128. Lacerta cauda tereti longa, pedibus pentadactylis, crista nulla, hypochondriis platicatis.*  
*Mus. Ad. Fr. I. p. 45.*  
*Seb. mus. I. t. 96. f. I.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Collum subtus triplici plica.*

- gurata.* 37. L. cauda tereti longiuscula, squamis rotundatis glabris, lateribus subfuscis.  
*Amoen. acad. 1. p. 294.* Lacerta cauda tereti, pedibus pentadactylis, squamis rotundatis levissimis subgriseis: lateralibus subfuscis.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 46.* Lacerta barbara.  
*Gron. mus. 2. p. 75. n. 48.* Scincus?  
*Seb. mus. 1. t. 89. f. 3.*  
*Aldr. quadr. 660.* Lacertus cyprius scincoides.  
*Habitat in Jersia Anglorum, Cypro.*  
*Viva colore auri pulcherrime nitet.*  
*Corpus teres quasi pingue. Aures concavae.*
- punctata.* 38. L. cauda tereti longa, dorso lineis duabus flavis: punctis nigris interspersis.  
*Mus. Ad. Fr. p. 46.* Lacerta eadem.  
*Seb. mus. 2. t. 2. f. 9.*  
*Habitat in Asia.*  
*Lineæ 2. flavescentes includunt dorsum & a lateribus eundem distinguunt.*
- lemmi- scata.* 39. L. cauda tereti longa, dorso lineis octo striatis.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 47.* Lacerta eadem.  
*Seb. mus. 1. t. 92. f. 4.*  
*Habitat in Guinea.*  
*Multum affinis L. agili.*
- fasciata.* 40. L. cauda tereti longiuscula, dorso brunneo lineis quinque flavescensibus.  
*Catesb. car. 2. t. 67.* Lacerta cauda cærulea.  
*Habitat in Carolina.*
- lineata.* 41. L. cauda tereti longa, palmis tetradactylis, corpore lineis quatuor flavis.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 46.* Lacerta cauda tereti longa, pedibus subunguiculatis fissis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.  
*Seb. mus. 2. t. 41. f. 6.* Lacerta zeilonica minor lemniscata.  
*Habitat in Zeilona.*
- Chalci- des.* 42. L. cauda tereti longa, pedibus tridactylis.  
*Syst. nat. 36. n. 7.* Lacerta eadem.

*Column. ecpbr. 1. p. 35. t. XXXVI. Sepس, Lacerta Chalcidica s. Chalcides.*

*Aldr. quadr. 638. Lacerta chalcidica.*

*Habitat in Europa australi, Africa.*

*Media inter Lacertas & Angues, sed auribus instructa.*

angvina. 43. L. cauda extremo rigidula, corpore striato, pedibus pinniformibus. †

*Seb. mus. 2. t. 68. f. 7. 8. Vermis serpentiformis ex africa.*

*Habitat in Cap. B. Spei lutofis, mihi non visa.*

## 106. RANA. *Corpus tetrapodium, nudum, ecaudatum.*

Pipa. 1. R. digitis anticis muticis quadridentatis, posticis unguiculatis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 49. Rana eadem.*

*Gron. mus. 2. p. 84. n. 64.*

*Seb. mus. 1. p. 121. t. 77. f. 1-4. Bufo s. Pipa americana.*

*Vincent. pip. 1726. t. 62. Bufo aquaticus surinamensis.*

*Bradl. nat. t. 22. f. 1. Rana surinamensis.*

*Vallijn. nat. 1. t. 41. f. 6.*

*Habitat Surinami.*

*Pullos e dorso nidulantes excludit.*

Bufo. 2. R. corpore ventricoso verrucoso lurido fuscoque.

*Fn. svec. 253. Rana palmis tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis: pollice breviore.*

*It. oel. 142.*

*Gesn. pist. 807. Rubeta s. Phrynum.*

*Zonst. quadr.*

*Bradl. nat. t. 21. f. 2.*

*Raj. quadr. 252. Bufo s. Rubeta.*

*Habitat in Europæ nemorofis ruderatis umbriosis, imprimis Ucraniae.*

*Devoratur a Falcone Buteone. Gesn. pist. 807.*

*Verrucæ lactescentes venenatae infuso, tactu, balitu. Delectatur Cotula, Actaea, Stachyde foetidis. Vivipara, mare, ut fertur, obstetricante. Insecta in fances fascino revocat; nocturna, fodiens.*

3. R.

*Palmae in plerisque Raneæ speciebus fissæ tetradactylæ, Plantæque pentadactylæ palmæ, rarissim vero obscure hexadactylæ.*

- Rubeta.** 3. R. corpore verrucoso, ano obtuso subtus punctato.  
*Syst. nat.* 37. n. 5. Rana palmis tetradactylis fissis,  
 plantis pentadactylis subpalmatis, ano subtus pun-  
 etato.
- It. Wgot.* 261.  
*Habitat in Europa.*
- gibbosa.** 4. R. corpore ovato-convexo: vitta longitudinali cinereo-  
 dentata, pedibus fissis.  
*Amoen. acad.* 1. p. 286. Rana palmis tetradactylis fissis,  
 plantis hexadactylis fissis, police latiusculo brevis-  
 simo.
- Mus. Ad. Fr.* 1. p. 48. Rana eadem.  
*Habitat in Exteris regionibus.*
- variega-** 5. R. corpore verrucoso, abdomine albo nigro-maculato,  
 ta. plica gulari.  
*Habitat in Exteris regionibus.*
- Bufoni* similis sed parva, nigra, supra undique punctis  
 exasperata, subtus albo nigroque varia. Pedes mutici:  
 Palmis tetradactylis fissis; Plantis pentadactylis palma-  
 tis. Rubra transversa sub collo.
- ventrico-** 6. R. ore semiovato, jugulo prominulo.  
 sa. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 48. Rana eadem.  
*Habitat in Indiis.*
- marina.** 7. R. scapulis gibbosis, clunibus nodosis.  
*Seb. mus.* 1. z. 76. f. 1. Rana marina maxima.  
*Habitat in America.*  
*Palmæ tetradactyla fissæ; Plantæ pentadactyla subfissæ.*
- typhonia.** 8. R. auricularibus lobis ovatis.  
*Habitat in America, clamans nocte sono cornicis tetra-  
 lucente. Rolander.*  
*Dorsum rugis quatuor longitudinalibus, punctis elevatis,  
 maculisque nigris. Pedes mutici. Palmæ tetradactylæ  
 fissæ; Plantæ pentadactylæ palmatae: digitis angu-  
 stis: secundo longissimo, absque unguibus orbiculatis.*
- ocellata.** 9. R. auribus ocellatis, pedibus muticis.  
*Brown. jam.* 466. t. 41. f. 4. Rana maxima compres-  
 sa miscella.

*Habitat in America.*

*Ad aures macula ocellaris utrinque. Palmæ tetradactylæ fissæ, Plantæ pentadactylæ, subpalmatae.*

**cornuta.** 10. R. palpebris conicis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 48. Rana eadem.*

*Seb. mus. 1. t. 72. f. 1, 2. Bufo cornutus s. spinosus virginianus.*

*Habitat in Virginia, ad spectu horrenda.*

**margina-** 11. R. lateribus marginatis, corpore lævi, plantis fissis.

**ta.** *Mus. Ad. Fr. p. 47. Rana lateribus marginatis.\**

*Habitat in Indiis.*

**paradoxa.** 12. R. femoribus postice oblique striatis. *Mus. Ad. Fr.*

*2. p. . .*

*Syst. nat. 36. n. 2. Lacerta cauda ancipiti, palmis tetradactylis fissis, plantis pentadactylis palmatis, abdome ventricoso.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 49. Rana piscis.*

*Seb. mus. 1. t. 78. f. omnes.*

*Merian. surin. 71. t. 71.*

*Habitat Surinami.*

**tempora-** 13. R. dorso planiusculo subangulato.

**ria.** *Faun. svec. 250. Rana palmis tetradactylis fissis, plantis pentadactylis palmatis: pollice longiore.*

*It. oel. 154. Rana temporaria.*

*Gesn. ovip. 46. Rana aquatica innoxia.*

*Aldr. ovip. 89. Rana.*

*Jonst. quadr. t. 75. f. 5, 6, 7, 8.*

*Raj. quadr. 247. Rana aquatica.*

*Bradl. natur. t. 21. f. 1.*

*Habitat in Europa.*

*Vere aquatica, æstate terrestris, viditat Culicibus. Devoratur ab Anatibus, Ardeis. Corde licet exempto salit.*

**esculen-** 14. R. corpore angulato, dorso transverse gibbo, abdomine marginato.

*Roes. ran. 51. t. 13. Rana viridis aquatica.*

*Habitat in Europæ fontibus.*

*Viridis lineis 3 flavis: intermedia ab ore ad anum ducta.*

*Dorsum transverse gibbo-diffractum. Pedes postici palmati. Mas auribus globo-inflatis. Cantu vespertino frequentiore prædictit pluviam.*

**Hyla.** 15. R. dorso angulato transverse gibbo, abdomine fascia replicata inguinali intercepto.

*Gesn. pise. 809.* Rana gibbosa 4, 5.

*Habitat in Europa*

*Sonus campanarum boatum e longinquo imitatur.*

**arborea.** 16. R. corpore lævi: subtus punctis contiguis tuberculato, pedibus fissis, unguibus orbiculato-dilatatis.

*Amœn. acad. I. p. 135.* Rana pedibus fissis; unguibus subrotundis, corpore lævi: postice angustato.

*Mus. Ad. Fr. I. p. 47.* Rana eadem.

*Gron. mus. 2. p. 84. n. 63.* Rana.

*Seb. mus. I. t. 73 f. 3.* Rana brasiliensis gracilis.

*Seb. mus. 2. t. 78. f. 5.* Rana americana rubra.

*Gesn. pise. 808.* Ranunculus viridis.

*B A næn. ecad. I. p. 285.* Rana pedibus fissis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: geniculis subtus tuberosis.

*Habitat sub foliis arborum Europæ, Americæ, Muscas in fauces revocans.*

**boans.** 17. R. corpore lævi: subtus punctis contiguis, pedibus palmatis: plantis pentadactylis, palmis tetradactylis, unguibus orbiculato-dilatatis.

*Amœn. acad. I. p. 285.* Rana palmis tetradactylis, plantis pentadactylis palmatis, digitorum apicibus subrotundis.

*Mus. Ad. Fr. I. p. 47.* Rana eadem.

*Seb. mus. I. t. 71. f. 3, 4.* Rana surinamensis.

*Habitat in America.*

*Simillima R. arboreæ, sed pedes omnes palmati & corpus album maximum, maculis etiam lacteis, modo hæc sufficient pro specie distinguenda.*

## II. SERPENTES.

*Os respirans.**Pedes Pinnæve nullæ.*107. CROTALUS. *Scuta abdominalia.**Scuta Squamæque subcaudales.**Crepitaculum terminale caudæ.**Scutis Scutellis.*192. horridus. 167—23 : 2. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 39.

♂

*Bradl. natur. t. 9. f. 1.**Seb. mus. 2. t. 95 f. 1.**Habitat in America.**Venenatissimus; antidotum Senega; a Sue consumitur; Aves Sciurosque ex arboribus in fances revocat.*195. Dryinas. 165—30. *Amœn. acad.* I. p. 297.

♂

*Habitat in America.**Exalbidus maculis flavescentibus paucis.*196. Durissus. 172—21 : 3. *Amœn. acad.* I. p. 500.

♂

*Kalm. act. Stockb. 1752. p. 310. ♂ 1753.**p. 52, 185.**Gron. mus. 2. p. 70. n. 45. Crotalophorus**174—22: 3?**Habitat in America.**Albo flavoque varius, maculis rhombeis nigris disco albis.*108. BOA. *Scuta abdominalia.**Scuta subcaudalia (absque crepitaculo.)*276. Scytale. 250—26. *Gron. mus. 2. p. 55. n. 10.**Scheuch. sacr. t. 737. f. 1.**Habitat in America. †**Color ex albo nigroque undulatus. Squamae capitis majores.*

**380. canina.** 203—77. *Mus. Aa. Fr.* I. p. 39. t. 3.  
*Seb. mus. 2. t. 96. f. 2.*  
*t. 81. f. 1.*

*Habitat in Americæ arboribus.*  
*Viridis, fasciis albis interruptis.*  
*Adoratur ab Americanis. Rolander.*

**299. Hipnale.** 179—120. *Seb. mus. 2. t. 34. f. 2.*  
*Habitat in Asia.*  
*Griseo-flavescente varius.*

**300. Constri-** 240—60. *Amœn. acad.* I. p. 497. t. 17. f. 3.  
**ctor.** *Mus. Ad. Fr.* I. p. 38.

*Gron. mus. 2. p. 69. n. 43. Cenchrus 248—60*  
*Seb. mus. 2. t. 98. f. 1.*  
*t. 99. f. 1, 2.*  
*t. 100. f. 1.*  
*t. 101. f. 1.*  
*t. 104. f. 1.*  
**I.** *t. 53. f. 1.*  
*t. 36. f. 5.*  
*t. 62. f. 2, 1.*

*Habitat in Indiis.*

**319. murina.** 254—65. *Gron. mus. 2. p. 70. n. 44. Coluber 254—69.*  
*Seb. mus. 2. t. 29. f. 1.*  
*Habitat in America.*  
*Rufus maculis supra rotundatis.*

**322. Cenchria.** 265—57.  
*Habitat Surinami.*  
*Flavescens ocellis albidis iride grisea.*

**345. Orophias.** 281—64. *Mus. De Geer.*  
*Habitat . . .*  
*Facie Constrictoris, sed fuscus.*

**375. Enydris.** 270—105. *Mus. De Geer.*  
*Habitat in America.*  
*Variegatus colore griseo. Dentes inferiores longi.*

**418. Hortula-** 290—128. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 37.  
**na.** *Seb. mus. 2. t. 84. f. 1.*  
*t. 74. f. 1.*

*Habitat in America.*

*Pallida maculis lividis cuneiformibus  
put areolis luteis horti instar.*

109. COLUBER. *Scuta abdominalia.*  
*Squamæ subcaudales.*

140. Vipera. 118—22. *Hasselqv.* *Aet. Ups. 1750.* p. 24.  
♂ *itin. 314. n. 60.*

*Habitat in Ægypto.*

*Brevissima, capite gibbo, squamis minutis.  
Officinalis hæc Vipera est ægyptiorum, nec  
Berus.*

153. Atropos. 131—22. *Mus. Ad. Fr. 1.* p. 22. t. 13. f. 1.  
♂ *Habitat in America.*  
*Canus, ocellis fuscis iride alba.*

160. Leberis. 110—50.  
♂ *Habitat in Canada. Kalm.*  
*Fasciæ lineares nigrae.*

161. Lutrix. 134—27.  
♂ *Habitat in Indiis.*  
*Dorsum ♂ Abdomen flava; Latera cœru-  
lescentia.*

162. Calama- 140—22. *Mus. Ad. Fr. 1.* p. 23. t. 6 f. 3.  
rius. *Habitat in America.*  
*Lividus fasciis punctisque linearibus fuscis;  
subtus fuso-tessellatus.*

170. Constri- 130—40.  
ctor. *Habitat in Canada. Kalm.*  
*Maxillæ apex simus triqueter.*  
*Adoritur homines circum pedes sese convolu-  
vens, sed innocuus.*

174. Ammo- 142—32. *Amer. acad. 1.* p. 506. n. 25.  
♂ dytes. *Bellon. itin. 203. Druinus.*  
*Aldr. serp. 169. Ammodytes.*

*Habi-*

Vipera cornuta Hasselqv. *Aet. Ups. 1750.* p. 27. est fictitius Coluber astu Arabum,  
qui unguibus avicula pertusurunt caput eidemque inservierunt.

*Habitat in Oriente.*

*Nasus terminatus verruca erecta.*

175. Ceraastes. 150—25. *Hasselqv. Act. Ups. 1750. p. 27.*

*iter. 315. n. 61. Coluber cornutus.*

*Bellon. itin. 203.*

*Habitat in Oriente.*

*Squamæ capitis omnes parvæ rotundatae.*

*Dens mollis exit e palpebra superiore.*

177. plicatilis. 131—46. *Amœn. acad. 1. p. 301. n. 26.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 23.*

*Seb. mus. 1. t. 57. f. 5.*

*Habitat in Ternatæis.*

*Lividus lateribus fuscis; subtus punctis triplici ordine fuscis.*

178. Domicel-118—60. *Amœn. acad. 1. p. 117. n. 5.*

la.

*Seb. mus. 2. t. 54. f. 1.*

*Habitat in Asia.*

*Albus fasciis nigricantibus, subtus concurrens.*

179. Alidras. 121—58. *Mus. De Geer.*

*Habitat in Indiis.*

*Albus totus.*

180. buccatus. 107—72. *Mus. Ad. Fr. p. 29. t. 19. f. 3.*

*Habitat in Indiis.*

*Fuscus fasciis albis. Caput album: fuscis punctis 2 verticis & triangulo supra narres.*

181. angulatus. 120—60. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 23. t. 15. f. 1.*

*Amœn. acad. 1. p. 119. n. 7.*

*Seb. mus. 2. t. 12. f. 3.*

*Habitat in Asia.*

*Griseo-fuscus fasciis nigris.*

183 Berus. 146—39. *Faun. svec. 260.*

♂

*Amœn. acad. 1. p. 113. n. 1.*

*Aldr. serp. 115, 116.*

*Habitat in Europa.*

184. Chersea. 150—34. *Faun. svec. 261.*

♂

*L. Act. Stockb. 1749. p. 246. t. 6.*

*Aldr. serp. 197. Aspis colore ferrugineo.*

*Habitat in Sveciae depressis; venenatissimus*

*& morsu saepius lethalis in Svecia; An  
satis diversus ab Aspide, licet apud nos  
minor?*

189. cæruleus. 165—24. *Amœn. acad. I. p. 303. n. 31.*

*Seb. mus. 2. t. 13. f. 3.*

*Habitat in America.*

*Cærulescens squamis altero latere albis; sub-  
tus albus.*

190. albus. 170—20. *Mus. Ad. Fr. I. p. 24. t. 14. f. 2.*

*Habitat in Indiis.*

*Albus immaculatus.*

192. Aspis. 146—46. *Gallis Aspice.*

♂

*Habitat in Gallia.*

*Rufus maculis dorsalibus fuscis alternis con-  
fluentibus in vittam.*

*Similis Chersea, sed major.*

193. Typhlus. 140—53. *Mus. De Geer.*

*Habitat in Indiis.*

*Cærulescens.*

201. Lebeti- 155—46. *Hasselqvist.*

♂ nus.

*Habitat in Oriente.*

*Subnebulatus, subtus punctis fuscis.*

202. melano- 140—62. *Mus. Ad. Fr. I. p. 24. t. 15. f. 2.*

cephalus.

*Habitat in America.*

*Fuscus glaberrimus capite atro.*

204. Cobella. 150—54. *Amœn. acad. I. p. 117. n. 14.*

*p. 302. n. 28.*

*p. 496. n. 14.*

*Gron. mus. 2. p. 65. n. 32.*

*Seb. mus. 2. t. 2. f. 6.*

*Habitat in America frequentissimus.*

Cine-

*Colubri Squamae caudales numerantur longitudinales, sc. per paris, quamvis alter-  
nae, cum duæ sepe habeant, ut unicum scutum sub abdomine.*

*Cinereus adspersus lineolis obliquis albis. Macula obliqua plumbea pone singulos oculos.*

207. Reginæ. 137—70. *Mus. Ad. Fr. p. 24. t. 13. f. 3.*

*Habitat in Indiis.*

*Fuscus abdomine albo nigroque vario.*

212. severus. 170—42. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 25. t. 8. f. 1.*

♂

*Seb. mus. 2. t. 54. f. 4.*

*Habitat in Asia.*

*Cinereus fasciis albis. Fascia cinerea inter oculos & pone nares.*

216. Aurora. 179—37. *Mus. Ad. Fr. p. 25. t. 19. f. 1.*

*Seb. mus. 2. t. 78. f. 3.*

*Habitat in America.*

*Lividus dorso flavo.*

217. Sipedon. 144—73. *Kalm.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Fuscus.*

218. maurus. 152—66.

*Habitat Algiriae. E. Brander.*

*Corpus supra fuscum lineis dorsalibus duabus; subtus atrum; a lineis dorsalibus ad abdomen utrinque fasciæ plures nigrae.*

219. stolatus. 143—76. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 26. t. 22. f. 1.*

♂

*Seb. mus. 2. t. 9. f. 1.*

*Habitat in America.*

*Griseus vittis 2 albis.*

*Scuta utrinque punto nigro.*

220. vittatus. 142—78. *Amœn. acad. 1. p. 30. n. 27.*

*Mus. Ad. Fr. p. 26. t. 18. f. 2.*

*Gron. mus. 2. p. 65. n. 31. Coluber 155—62.*

*Seb. mus. 2. t. 45. f. 5.*

*t. 60. f. 2, 3.*

*Habitat in America.*

*Scuta margine fusca.*

*Vitta alba dentata sub cauda.*

221. miliaris. 162—59. *Mus. Ad. Fr.* p. 27.  
*Habitat in Indiis.*  
*Fascus : squamis macula alba. Subtus albus.*
227. rhombea- 157—70. *Mus. Ad. Fr.* p. 27. t. 24. f. 2.  
*tus.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Cærulescens maculis nigris medio cæruleis  
 rhombatis.*
229. cyaneus. 149—110. *Amœn. acad.* I. p. 493. n. 10.  
*Seb. mus. 2. t. 43. f. 2.*  
*Habitat in America.*  
*Saturate cæruleus, habitu Abetullæ; subtus  
 virens.*
230. Natrix. 170—60. *Faun. Svec.* 259.  
*It. gotl. 146.*  
*Amœn. acad. I. p. 116. n. 3.*  
*Gron. mus. 2. p. 63. n. 27.*  
*Habitat in Europa; in fîmetis pariens.*  
*Niger macula alba utrinque ad collum.*
233. Æscula- 190—43. *Amœn. acad.* I. p. 497. n. 15.  
*pii.*  
*Mus. Ad. Fr. I. p. 29. t. 11. f. 2.*  
*Gron. mus. 2. p. 59. n. 18.*  
*Seb. mus. 2. t. 18. f. 4.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Fascie albae nigræque, hæ linea annulatae albo dimidiatae..*
234. agilis. 184—50. *Amœn. acad.* I. p. 304. n. 33.  
*Mus. Ad. Fr. I. p. 27. t. 21. f. 2.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Fascie fuscae albæque.*
235. lacteus. 203—32. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 28. t. 18. f. 1.  
*♂*  
*Habitat in Indiis.*  
*Albus maculis geminatis atris. Vertex ater  
 linea longitudinali alba.*
244. aulicus. 184—60. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 29. t. 12. f. 2.  
*Seb. mus. I. t. 91. f. 5.*  
*Habitat in America.*

Gri-

---

*Serpentes Prædam, collo duplo crassiore, sœpe ingurgitant, ob maxillas dilatabiles,  
 nec articulatas.*

*Griseus fasciis albis latere bifurcatis. Vertex albus.*

246. monilis. 164—82. *Mus. De Geer.*

*Habitat in America.*

*Corpus annulatum; monile punctis 3 albis a tergo.*

251. pallidus. 156—96. *Amœn. acad. I. p. 494. n. II.*

*Mus. Ad. Fr. I. p. 31. t. 7. f. 2.*

*Habitat in Indiis.*

*Pallidus maculis griseis vagis punctisque fuscis. Lineolæ binæ interruptæ laterales nigricantes.*

252. lineatus. 169—84. *Mus. Ad. Fr. I. p. 30. t. 12. f. 1.*  
*t. 20. f. 1.*

*Seb. mus. 2. t. 12. f. 3.*

*Habitat in Asia.*

*Cærulescens vittis linearibus 4 fuscis.*

253. Naja. 193—60. *Mus. Ad. Fr. p. 30. t. 21. f. 1.*

*♂ Seb. mus. 2. t. 90. f. 1, 2.*

*t. 85. f. 1.*

*t. 89. f. 1, 2, 3, 4.*

*t. 97. f. 1, 2, 3, 4.*

*t. 94. f. 1.*

*I. t. 44. f. 1.*

*Kæmpb. amœn. 565. t. 567.*

*Amœn. acad. I. p. 305.*

*Habitat in India orientali.*

*Colli latera dilatata in membranam supra pectam perspicillis albis.*

*Omnium venenatissimus; antidotum Opbiorbiza; ab Ichneumone occiditur.*

254. Padera. 198—56. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . .*

*Habitat in Indiis.*

*Macularum fuscum multa paria secundum dorsum connexa lineola; totidemque simplices maculae ad latera.*

258. canus. 188—70. *Mus. Ad. Fr. I. p. 31. t. II. f. 1.*

*Habitat in Indiis.*

*Canus*

---

Telo venenato reflexili armatos, signo ♂ notatos, observa.

*Canus fasciis subfuscis, ad latera puncta  
2 nivea.*

260. fibilans. 160—100. *Amœn. acad.* I. p. 302. n. 30.  
*Seb. mus.* 2. t. 52. f. 4.

t. 56. f. 4.

t. 107. f. 4.

*Habitat in Asia.*

*Cærulescens vittis nigris, subtus albus.*

261. laticauda- 220—42. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 31. t. 16. f. 1.  
tus.

*Habitat in Indiis.*

*Cinereus fasciis fuscis.*

*Cauda obtusa compreffo-anceps.*

262. Sirtalis. 150—114. *Kalm.*

*Habitat in Canada.*

*Vittæ tres viridi- cærulescentes in corpore  
fusco tenui striato.*

263. atrox. 196—69. *Amœn. acad.* I. p. 305 n. 35.

*Mus. Ad. Fr.* I. p. 33. t. 22. f. 2.

*Seb. mus.* I. t. 43. f. 5.

*Habitat in Asia.*

*Canus squamis carinatis.*

*Caput depresso, compressum, angulatum  
squamis minimis.*

264. Sibon. 180—85. *Amœn. acad.* I. p. 304. n. 32.

*Seb. mus.* I. t. 14. f. 4.

*Habitat in Africa.*

*Fusco-ferrugineus albo adspersus; subtus al-  
bus maculis fuscis.*

265. nebula- 185—81. *Mus. Ad. Fr.* p. 32. t. 24. f. I.

*Catesb. car.* 2. p. 42. t. 42?

*Habitat in America.*

*Fusco cinereoque nebulatus; subtus albo fusco-  
que varius; adscendit tibias ♂ stringit.*

266. fuscus. 149—117. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 32. t. 17. f. I.

*Seb. mus.* 2. t. 54. f. 2.

t. 71. f. I.

t. 72. f. I.

t. 87. f. I.

s. 91. f. I.

*Habits*

*Habitat in Asia.*

*Cinereo-fuscus, habitu Abætullæ. Pone oculos macula oblonga fuscæ.*

267. *Saturninus.* 147—120. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 32. t. 9. f. 1.*

*Habitat in Indiis.*

*Lividus cinereo-nebulosus. Oculi magni.*

270. *candidus.* 220—50. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 33. t. 7. f. 1.*

*Habitat in Indiis.*

*Albicans fasciis fuscis.*

271. *niveus.* 209—62. *Mus. De Geer.*

*Seb. mus. 2. t. 15. f. 1.*

*Habitat in Africa.*

*Albus immaculatus.*

272. *scaber.* 228—44. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 36. t. 10. f. 1.*

*Habitat in Indiis.*

*Fusco nigroque nebulatus, squamis carinatis.*

*Vertex macula nigra posse bifida.*

273. *carinatus.* 157—115. *Mus. Ad. Fr. p. 31.*

*Habitat in Indiis.*

*Plumbeus squamis margine pallidis. Subtus albus. Dorsum carinatum.*

275. *corallinus.* 193—82. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 33.*

*Seb. mus. 2. t. 17. f. 1.*

*Habitat in Asia.*

*Glaucus vittis tribus fasciis, squamis distan-  
tibus; subtus pallidus punctis canis.*

276. *ovivorus.* 203—73. *Kalm.*

*Pis. bras. 279. Guinpuaguara.*

*Habitat in America.*

279. *exoletus.* 147—132. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 34. t. 10. f. 2.*

*Habitat in Indiis.*

*Cinereo-carulescens, habitu Abætullæ.*

281. *Situla.* 236—45.

*Habitat in Ægypto. Hasselqvist.*

*Griseus vittis duabus nigris.*

282.

*Color in Serpentibus plurimum variat, ut nunquam ex colore ipsis fidendum.*

282. Triscalis. 195—86.

*Habitat in Indiis.*

*Corpus glaucum. Lineolæ longitudinales dorsales tres fuscae ad nucham conjunctæ, quarum media supra anum desinat; insuper us singulo latere linea fusca cum prioribus duabus excurrens ad apicem caudæ.*  
*Cauda  $\frac{1}{3}$ .*

285. lemnisca- 250—37. *Amœn. acad.* I. p. 118. n. 6.  
tus.

p. 413 n. 9.

*Mus. Ad. Fr.* I. p. 34. t. 14. f. 1.  
*Seb. mus.* I. t. 10. f. ult.  
 2. t. 76. f. 3.

*Habitat in Asia.*

*Fasciæ albæ nigræque, hæ annulis duabus albis sape interruptæ. Corpus glaberrimum.*

286. annulatus. 190—96. *Amœn. acad.* I. p. 120. n. 9.

p. 305. n. 34.

*Mus. Ad. Fr.* p. 34 t. 8. f. 2.  
*Seb. mus.* 2. t. 38. f. 2.

*Habitat in America.*

*Albus maculis alternis fuscis rotundis, pa- sim confluentibus.*

287. Dipsas. 152—135. *Amœn. acad.* I. p. 302. n. 29.

♂

*Gron. mus.* 2. p. 64. n. 30.

*Seb. mus.* 2. t. 24. f. 3.

*Habitat in America.*

*Cærulescens squamis margine albidis. Cau- da subtus sutura cærulecente.*

290. Pelias. 187—103. *Mus. De Geer.**Habitat in Indiis.*

*Fuscus pone oculos ♂ verticem, reliqua nigro duplicata. Abdomen viride, utrinque linea flava.*

293. Tyria. 210—83.

*Habitat in Ægypto. Hasselqvist.*

*Albidus triplici ordine longitudinali macula- rum rhombearum fuscarum.*

307. jugularis. 195—102.

*Habitat in Ægypto. Hasselquist.*  
*Niger jugulo sanguinolento.*

309. Petola. 209—90. *Amaen. acad.* I. p. 306. n. 36.

p. 119. n. 8.

p. 495. n. 13.

*Gron. mus. 2. p. 57. n. 13.**Seb. mus. 1. t. 54. f. 4.**Habitat in Africa.**Plumbeus fasciis testaceis.*307. Molurus. 248—59. *Mus. De Geer.**Habitat in Indiis.**Simillimus Boæ, sed scuta & squamae capitis  
majores, ut in Colubris.*313. Ahætulla. 163—150. *Amaen. acad.* p. 115. n. 2.

p. 495. n. 12.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 35. t. 22. f. 3.**Gron. mus. 2. p. 61. n. 24.**Seb. mus. 2. t. 82. f. 1.*

2. t. 12. f. 3.

*Bradl. natur. t. 9. f. 2.**Habitat in Asia, America.**Viridi-aureus squamis apice nigris; Fascia  
nigra trans oculos.*314. petolarius. 212—102. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 35. t. 9. f. 2.**Habitat in Indiis.**Fuscus fasciis albis; subtus pallidus.*316. Haje. 207—109. *Hasselqv. iter. 317. n. 62.* Coluber scutis abd. 206, squam. caudal. 60.*Habitat in Ægypto inferiore.**Maximus, ater fasciis obliquis & squamis  
dimidiato albis.*323. filiformis. 165—158. *Mus. Ad. Fr. p. 36. t. 17. f. 2.**Habitat in Indiis.**Niger, angustissimus, subtus albus. Caput  
corpore crassius.*325. pullatas. 217—108. *Amaen. acad.* I. p. 300. n. 25.*Mus. Ad. Fr. 1. p. 35. t. 20. f. 3.*

*Gron. mus. 2. p. 56. n. 12. Coluber 215-104.*  
*Seb. mus. 2. t. 20. f. 1.*  
*Habitat in Asia.*  
*Fascia atre punctis albis. Tempora nivea*  
*maculis atris.*

326. Hippo- 232-94. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 36. t. 16. f. 2.*  
crepis. *Habitat in America*  
*Lividus maculis fuscis. Fascia fusca inter*  
*oculos & arcuata occipitis.*

328. minervæ. 238-90. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 36.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Glancus vitta dorsali fusca. Vittæ capitis*  
*3 fuscæ.*

337. cinereus. 200-137. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 37.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Cinereus abdomine albo angulato. Caudæ*  
*squamæ margine ferrugineæ.*

339. viridissi- 217-122. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . .*  
mus. *Habitat Surinami.*  
*Viridissimus scutis abdominis medio dila-*  
*tatis.*

340. mucosus. 200-140. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 37. t. 23. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Caput cærulescens.*

344. Cenchoa. 220-124. *Amœn. acad. 1. p. 306. n. 37.*  
*Seb. mus. 2. t. 16. f. 2, 3.*  
*Habitat in America.*  
*Fuscus maculis pallidis fasciis niveis. Caput*  
*subglobosum.*

359 myteri- 192-167. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 28. t. 5. f. 1.*  
♂ zans. *t. 19. f. 2.*  
*Gron. mus. 2. p. 59. n. 19.*  
*Seb. mus. 2. t. 23. f. 2.*  
*Catesb. carol. 2. p. 47. t. 47.*  
*Habitat in America.*  
*Rostrum productum tetragonum; latera vit-*  
*ta linearis pallida.*

385. cæruleo-  
scens. 215--170. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 37. t. 20. f. 2.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Cæruleo-scens.*

Arges. . . . Seb. *mus. 2. t. 103. f. 1.*  
*Habitat in Africa.*

*Occiput bilobo-gibbum. Corpus ocellis trans-*  
*veris per annulos digestis. Mibi non vi-*  
*sus, nec scuta notata.*

Zurraiche. *C. Vekribus facetus. habitat in Numidia.*  
Leffah. *C. Luciane Diplos. habitat in Numidia.*

## 110. ANGUIS. *Squamæ abdominales &* *Squamæ subcaudales.*

160. bipes. 100-60. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 21. t. 28. f. 3.*  
Seb. *mus. 1. t. 53. f. 8.*

*t. 86. f. 3.*

*Habitat in Indiis.*

*Pedes 2 brevissimi, didactyls, ad anum.*  
*Pallida puncto fusco in singula squama.*

197. Melea-  
gris. 165--32.  
Seb. *mus. 2. t. 21. f. 4.*

*Habitat in Indiis.*

*Similis A. bipedi, glauca punctis nigris mul-*  
*tiplici ordine longitudinali.*

## P 2

198.

COLUBRI a me non visi, a Cl GRONOVO in museo 2. descripti.

165	abd.	141	caud.	24.	Gron.	41.	Seb. 2	t. 98.	f. 1.
175	-	156	-	39.	Gron.	38.	ferrugineo cæruleo alboque varius.		
177	-	135	-	42.	Gron.	39.	albus maculis albis nigrisque.		
181	-	159	-	42.	Gron.	29.	Seb. 1. t. 33. f. 6. albo-rufus.		
202	-	142	-	60.	Gron.	36.	Seb. 2. t. 35. f. 4. cæruleo-scens.		
203	-	153	-	50.	Gron.	34.	albus lineis maculisque nigris.		
212	-	149	-	63.	Gron.	33.	albus cinctus lineis nigris.		
213	-	138	-	74.	Gron.	37.	Seb. 2. t. 20. f. 2. cæruleo maculis nigris.		
220	-	160	-	60.	Gron.	28.	cinctus lineis albis nigrisque.		
230	-	165	-	74.	Gron.	25.	Seb. 2. t. 21. f. 3. albus fasciis obscuris.		
234	-	174	-	60.	Gron.	22.	Seb. 2. t. 33. f. 1. cinereo cæruleo.		
240	-	163	-	77.	Gron.	26.	Seb. 2. t. 1. f. 9. & t. 9. f. 2. vitta nigra.		
260	-	180	-	80.	Gron.	20.	albo brunneoque varius.		
266	-	191	-	75.	Gron.	15.	brunneus punctis albis.		
293	-	202	-	96.	Gron.	14	maculis brunneis.		
311	-	189	-	122.	Gron.	17.	purpurascens maculis atris.		
314	-	172	-	142.	Gron.	23.	cæruleus linea laterali atro.		
315	-	190	-	125.	Gron.	28.	cinctus lineis albis nigrisque.		
342	-	272	-	70.	Gron.	11.	Seb. 2. t. 199. f. 2. nobilatus.		

198. *cotubri-* 180—18. *Hasselqv. iter. 320. n. 65.*  
*na.* *Habitat in Ægypto.*  
*Pallido fusoque pulchre variegata.*
209. *Jaculus.* 186—23. *Hasselqv. iter. 319. n. 64.*  
*Habitat in Ægypto.*  
*Squamæ abdominis paulo latiores.*
212. *maculata.* 200—12. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 21. t. 21. f. 3.*  
*Gron. mus. 2. p. 53. n. 5.*  
*Seb. mus. 2. t. 100. f. 2.*  
*I. t. 53. f. 7.*  
*Habitat in America.*  
*Supra flava, vitta dorsali fasciisque linearibus fuscis.*
214. *reticulata.* 177—37. *Gron. mus. 2. p. 54. n. 7.*  
*Scheuch. sacr. t. 747. f. 4.*  
*Habitat in America. †*  
*Color squamarum fuscus disco albo.*
215. *Cerastes.* 200—15. *Hasselqv. Act. Ups. 1750. p. 28.*  
*it. 320. n. 66.*  
*Habitat in Ægypto. †*
237. *lumbrica-* 230—7. *Gron. mus. 2. p. 52. n. 3.*  
*lis.* *Brown. jam. 460. t. 44. f. 1.*  
*Seb. mus. 1. p. 137. t. 86. f. 2.*  
*Habitat in America. †*  
*Color ex albido flavescens.*
250. *laticauda.* 200—50. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . .*  
*Habitat Surinami.*  
*Cauda compressa, acuta, pallida fasciis fuscis.*
253. *Scytale.* 240—13. *Amœn. acad. 1. p. 296.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 21. t. 6 f. 2.*  
*Gron. mus. 2. n. 4. Anguis 227—14.*  
*Seb. mus. 2. t. 2. f. 1, 2, 3, 4.*  
*t. 7. f. 4.*  
*t. 20. f. 3.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Albida squamarum marginibus passim ferrugineis, fasciis fuscis.*

- 262. Eryx.** *Gron. mus. 2. p. 35. n. 9. (126—136.)*  
*Habitat in America (non vidi.)*  
*Cinerea lineis tribus nigris; fubtus cæru-*  
*lescens.*
- 270. fragilis.** 135—135. *Faun. svec. 258.*  
*Aldr. serp. 245. Cæcilia vulgaris.*  
*Habitat in Europa.*  
*Hujus maxima fragilitas lepide explicata a*  
*Lemery in dictionario.*

**III. AMPHISBÆNA. Annuli trunci caudæque.**

- 230. fuligino-** 200—30. *Amœn. acad. 1. p. 295.*  
*ta.* *Mus. Ad. Fr. 1. p. 20.*  
*Gron. mus. 2 p. 1. Amphisbæna 209-25.*  
*Raj. quadr. 288.*  
*Seb. mus. 2. t. 1. f. 7.*  
*t. 18. f. 2.*  
*t. 22. f. 3.*  
*t. 73. f. 4.*  
*t. 100. f. 3.*  
*1. t. 88. f. 3.*  
*Habitat in America.*  
*Albo nigroque varia.*
- 239. alba.** 223—16. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 26. t. 4. f. 2.*  
*Seb. mus. 2. t. 24. f. 1.*  
*t. 6. f. 4.*  
*Habitat in America.*  
*Alba tota.*

**112. CÆCILIA. Rugæ trunci caudæque.**  
*Labium superius tentaculis 2.*

- 135. tentacula-** 135—0. *Amœn. acad. 1. p. 489. t. 17. f. 2.*  
*ta.* *Mus. Ad. Fr. 1. p. 19. t. 5. f. 2.*  
*Gron mus. 2. n. 1. p. 52.*  
*Habitat in America.*
- 350. glutinosa.** 340—10. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 19. t. 4. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Fusca, linea laterali albida.*